

# Über die Grössenverhältnisse

des linken Ventrikels

bei der Mitralinsuffizienz.



Inaugural-Dissertation

zur

**Erlangung der Doktorwürde**

in der

**gesamten Medicin**

der

**hohen medicinischen Facultät**

der

*Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität*


*in München*

vorgelegt von

**BERNHARD BÄR**

APPROB. ARZT

aus Frankfurt a. M.



**Frankfurt a. M.**

Buchdruckerei von M. Slobotzky

**1897.**

REFERENT:

HERR GEHEIMRAT PROF. DR. V. ZIEMSEN.

Meinen lieben Eltern.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Bei ausgebildeten Klappenfehlern des Herzens findet man denjenigen Herzabschnitt, welcher rückwärts oder oberhalb der verengten Ostien oder der insuffizienten Klappen gelegen ist, mit solcher Regelmässigkeit erweitert oder hypertrophiert, dass man wohl berechtigt ist, diese Consequenz als eine gesetzmässige zu betrachten. Dem Gesetze der Retrodilatation zufolge ist es die Hypertrophie und Dilatation des rückwärts vom Strömungshindernis gelegenen Herzabschnittes, wodurch die Compensation der Klappenfehler bewerkstelligt wird; und wenn der betreffende Herzabschnitt einer ausgiebigen Hypertrophie nicht fähig ist, wie es bei den Vorhöfen der Fall ist, so macht sich entweder das Strömungshindernis noch weiter rückwärts geltend, es entwickelt sich z. B. bei Fehlern der Mitralis auch eine Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels, oder die Compensation kommt gar nicht zu Stande, wie bei den Erkrankungen der Tricuspidalis.

Dieser Anschauung zufolge muss die Mitralinsuffizienz zunächst eine Erweiterung und bis zu einem gewissen Grade auch eine Hypertrophie des linken Vorhofs, weiterhin aber auch Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels bewirken. Dieser Auffassung huldigte man früher ganz allgemein. Forget sprach sich in einem 1852 erschienenen Werke „Diseases of the heart“ über den percutorischen Befund bei der Mitralinsuffizienz folgendermassen aus:

„Die Abwesenheit der Erweiterung des linken Ventrikels ist das wahrhafte Zeichen, dass der

Fehler an der Mitralis sitzt, im Gegensatz zu den Klappenfehlern an der Aorta.“

Uebereinstimmend mit dieser Auffassung sind die Darlegungen einer grossen Anzahl von Hand- und Lehrbüchern innerer Krankheiten. Sie alle stellen die Wirkungen der Mitralinsuffizienz ungefähr folgendermassen dar:

Durch die bei jeder Systole in den linken Vorhof regurgitierende Blutmasse wird der letztere dilatirt und mit Blut überfüllt; die Drucksteigerung im linken Vorhof beeinträchtigt den Abfluss des Blutes aus den Lungenvenen, es entwickelt sich eine Erweiterung und Ueberfüllung der Gefässe des kleinen Kreislaufes, die sich weiterhin auf das rechte Herz zurückerstreckt. Infolge der gesteigerten Widerstände, welche daraus für den linken Vorhof sowohl als auch für den rechten Ventrikel erwachsen, entwickelt sich eine excentrische Hypertrophie der genannten Herzabschnitte, welche zur Compensation des Klappenfehlers ausreicht.

So war die allgemein anerkannte Auffassung der Sache bis etwa zur Mitte der 70er Jahre. Von dieser Zeit ab erhoben sich die Stimmen einer Anzahl Autoren, welche der Mitralinsuffizienz auch eine Beeinflussung des linken Ventrikels zuschreiben. Und während die einen nur behaupten, dass in einer Anzahl von Fällen von Mitralinsuffizienz der linke Ventrikel erweitert und hypertrophisch würde, gehen andre so weit, dass sie erklären, dass ohne Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels die Compensation einer Mitralinsuffizienz überhaupt nicht zu Stande kommen könne.

Höchst interessant sind die verschiedenen Theorien, mit denen die Vertreter der letzteren extremen Anschauung dieselbe zu begründen suchen.

Ein Hauptvertreter und zugleich wohl der eigentliche Begründer dieser extremen Auffassung ist L. Waldenburg, welcher in einem 1878 in der Berliner klinischen Wochenschrift veröffentlichten und „Pulsuhr und Puls“ überschriebenen Artikel sich folgendermassen ausspricht:

„Nachdem durch die Rückstauung des Blutes in den linken Vorhof und die Lungen eine Dilatation und Hypertrophie des linken Vorhofs und der rechten Herzhälfte eingetreten, hat sich ein Kreislauf — gleichgewicht derart ausgebildet, dass der kleine Kreislauf auf Kosten des grossen überfüllt ist. Der dilatierte rechte Ventrikel vermag seinen vermehrten Blutinhalte nicht vollständig zu entleeren wegen der Widerstände, die die Rückstauung des Blutes im linken Vorhof und in den Lungen darbietet; dagegen hat der gleichfalls dilatierte linke Vorhof bei seiner Systole für seine Entleerung in die linke Kammer — wenn nicht gleichzeitig auch Stenose besteht — keinerlei Widerstände zu überwinden, und somit erhält der linke Ventrikel in seiner Diastole eine gegen die Norm vermehrte Blutmenge zugeführt.

„Wenn er nun auch bei seiner Systole nur einen Teil dieses Blutes in die Arterien sendet, einen anderen Teil ins Atrium regurgitieren lässt, so hat er doch immer eine gegen die Norm vermehrte Blutmenge zu bewältigen, und die Folge hiervon ist zunächst Dilatation des Ventrikels und, ist der Herzmuskel noch kräftig genug, Hypertrophie desselben.

Durch diese Hypertrophie des dilatierten Ventrikels kann eine mehr oder weniger vollständige Compensation des Herzfehlers zustande kommen, indem der kräftig arbeitende und stärker gefüllte Ventrikel trotz der Regurgitation doch eine grössere Blutmenge als zuvor in die Aorta treibt.“

Ganz ähnliche Betrachtungen finden sich in vielen modernen Hand- und Lehrbüchern. Strümpell besonders spricht sich scharf für eine excentrische Hypertrophie des linken Ventrikels aus, „denn dass von der abnorm grossen Blutmenge nur ein Teil in der Richtung des normalen Blutstroms in die Aorta gelangt, ein kleinerer Teil rückläufig in den Vorhof hineinströmt, dies macht die Arbeitsleistung des linken Ventrikels als solche nicht geringer.“

A. Weil (Berliner klinische Wochenschrift 1881) sucht seine Ansicht, dass eine Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels für die Compensation der Mitralinsufficienz unerlässlich sei, auf etwas anderen Wege zu beweisen. Seine Beweisführung ist folgende: Die Menge des unter normalen Verhältnissen mit jeder Systole in die Aorta geschleuderten Blutes sei =  $a$  ccm. Wenn nun bei Mitralinsufficienz mit jeder Systole  $b$  ccm in der linken Vorhof regurgitieren, so wird die Menge des mit jeder Systole in die Aorta gelangenden Blutes nur  $a - b$  ccm sein. Diese Menge wird eine abnorm geringe sein, mag der linke Vorhof und der rechte Ventrikel noch so sehr hypertrophisch und dilatirt sein, mögen sie ihr Blut mit noch so grosser Gewalt in den linken Ventrikel treiben. Erst dann, wenn die Capacität des linken Ventrikels um so viel grösser ge-

worden ist, dass er anstatt  $a$  nunmehr  $a + b$  ccm. zu fassen vermag, werden wie in der Norm mit jeder Systole  $a$  ccm in die Aorta gelangen, trotzdem  $b$  ccm in den Vorhof regurgitieren.

Weiterhin pflichtet A. Weil der allgemein gültigen Anschauung, dass bei Mitralinsuffizienz eine Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels eine notwendige Consequenz dieses Klappenfehlers sei, nur in bedingter Weise bei. Er begründet diese seine Ansicht ausführlich theoretisch und giebt ferner an, dass er ausserordentlich häufig bei Mitralinsuffizienz wohl die excentrische Hypertrophie des linken Ventrikels, dagegen keine Dilatation des rechten Herzens gefunden habe.

Am weitesten von der allgemeinen Ansicht weicht vielleicht Riegel ab (Berliner klinische Wochenschrift 1888). Er nimmt ebenfalls für die Compensation der Mitralinsuffizienz eine Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels in Anspruch und leugnet es, dass für die Dauer der Compensation eine Dilatation des rechten Ventrikels nachzuweisen sei. Vielmehr behauptet er, eine deutlich nachweisbare Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts sei das erste Zeichen des nicht mehr compensierten Klappenfehlers. Er stellt mit anderen Worten die compensatorische Dilatation des linken Ventrikels der Stauungsdilatation des rechten gegenüber.

Alle bisher genannten Autoren stützen ihre Ansichten hauptsächlich auf theoretische Erwägungen. Dunbar (Deutsches Archiv für klinische Medicin 1892) war der erste, der den Weg einschlug, der wohl am meisten geeignet erscheint, die in Rede stehende

Frage zu entscheiden, nämlich den Weg der Statistik. Er führt etwa 100 Fälle von compensierter Mitralinsufficienz an und zeigt in der That, dass sich in einer Anzahl der Fälle eine Verlagerung des Spitzenstosses nach links nachweisen liess.

Bekanntlich kann man aber aus einer Verlagerung des Spitzenstosses noch nicht ohne Weiteres auf eine Hypertrophie des linken Ventrikels schliessen, da sich ein solches Verhalten gar nicht selten auf eine Verbreiterung des rechten Ventrikels beziehen lässt (siehe Rosenbach in Eulenburgs Real-Encyclopaedie der gesamten Heilkunde). Doch muss umgekehrt eine Hypertrophie des linken Ventrikels stets zu einer Verlagerung des Spitzenstosses nach links führen. Nun aber findet sich der Spitzenstoss in weitaus den meisten Fällen von reiner compensierter Mitralinsufficienz an ganz normaler Stelle, d. h. bei Leuten mittleren Alters im fünften Intercostalraum dicht einwärts der Mamillarlinie, bei alten Leuten um einen Intercostalraum tiefer.

Dieser Thatsache gegenüber kann die Ansicht von der obligatorischen Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels bei compensierter Mitralinsufficienz nicht aufrecht erhalten werden.

Den mechanischen Theorien über die Entstehungsweise der linksseitigen Herzhypertrophie bei Mitralinsufficienz hat namentlich Schroetter ihre Berechtigung abgesprochen. Die Ansicht, dass das Blut unter gesteigertem Drucke aus dem Vorhofe in den Ventrikel einströmen müsse, dieser daher dilatirt werde und compensatorisch hypertrophieren müsse, ist dem genannten Autor zufolge unhaltbar. Die

Hypertrophie des linken Ventrikels, welche neben der folgerichtigen Hypertrophie der rechten Kammer bei Insuffizienz der Mitralklappe manchmal vorkomme, müsse in einer reinen Erkrankung des Herzmuskels ihre Erklärung finden.

Ferner widerspricht allen angeführten Theorien ein klarer Modellversuch Basch's (Allgemeine Physiologie und Pathologie des Kreislaufs). Basch erzeugte an dem von ihm construirten Kreislaufsmodell eine Mitralinsuffizienz und verstärkte kurze Zeit darauf die Arbeit des rechten Ventrikels. Dabei zeigte sich, dass der Druck im rechten Vorhofe beträchtlich sinkt, dass dagegen der Druck in der Aorta nur ganz unerheblich steigt. Hiermit war also bewiesen, dass von der Flüssigkeit, die der stärker arbeitende rechte Ventrikel aus dem rechten Vorhofe mehr schöpft, der weitaus grösste Teil in den Lungen zurückbleibt und nur ein sehr unbedeutender Teil in den linken Ventrikel gelangt, dass also zu einer merklichen Dilatation des letzteren kein Anlass gegeben ist.

Bauer (Annalen der städtischen allgemeinen Krankenhäuser zu München, Band I, 1878) formulierte seine Ansicht so, dass die Anwesenheit einer bedeutenden Hypertrophie des linken Ventrikels in den meisten Fällen gegen das Vorhandensein einer Mitralinsuffizienz infolge von Destructionen der Klappe und zu Gunsten einer muskulären oder relativen Insuffizienz verwendet werden könne.

Auf Anregung des Herrn Geheimrat Professor Dr. v. Ziemssen unternahm ich es, die in den Jahren 1890—1894 incl. auf der ersten medicinischen Abteilung des hiesigen Krankenhauses l/Isar beobach-

teten Fälle von Mitralinsufficienz einer Prüfung mit Rücksicht auf die besprochene Frage zu unterziehen. Die Resultate dieser Statistik finden sich in den folgenden Tabellen zusammengestellt. In der ersten Tabelle sind die Fälle aufgeführt, wo der Spitzenstoss sich an normaler Stelle fand, in der zweiten Tabelle diejenigen, wo sich eine Verlagerung des Spitzenstosses aufweisen liess.

Vor einem Jahre hat auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. Bauer Herr cand. med. Frensdorff die analogen Untersuchungen auf Grund des Materials der zweiten medicinischen Abteilung ausgeführt.

---

# A. Fälle, bei denen sich der Spitzenstoss an normaler Stelle fand.

## I. Männer.

| Name     | Alter | Herzbefund.                             |                                                            | Anamnese und sonstiger Befund.                                |
|----------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts      | Spitzenstoss                                               |                                                               |
| 1. J. B. | 42    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum 2 cm. einwärts von d. Mamillarlinie. | Leicht. systol. Ger. an d. Herzspitze. 2 Gefässtöne klingend. |
| 2. J. B. | 45    | Rechter Sternalrand.                    | Nicht fühlbar, aber keine Verbreiterung nach links.        | Leichtes systolisches Geräusch an d. Herzspitze.              |
| 3. J. A. | 54    | Ueber den rechten Sternalrand hinaus.   | Nicht rührbar, aber keine Verbreiterung nach links.        | Systolisches Geräusch an d. Herzspitze.                       |
| 4. J. S. | 58    | Mitte des Sternums.                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.                 | Systolisch. Geräusch an d. Herzspitze.                        |
| 5. A. B. | 18    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 4. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.                 | Systolisch. Geräusch an d. Herzspitze.                        |
| 6. B. M. | 17    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 4. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.                 | Systol. Geräusch an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton klappend.   |

| Name      | Alter | Herzbefund.                              |                                            |                                                                                   | Anamnese und sonstiger Befund                                   |
|-----------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenzed. Herzdämpfung nach rechts        | Spitzenstoß                                | Auscultation                                                                      |                                                                 |
| 7. J. E.  | 17    | Mitte des Stern.                         | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Leises systol. Ger. an der Spitze. 2. Pulmonalton accentuirt.                     | Stechen in der Brust und Kurzatmigkeit.                         |
| 8. F. F.  | 39    | Etwas über den link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Systolisch. Geräusch an d. Herzspitze.                                            | Anamnese wegen mangelnder Sprachkenntnisse nicht zu erheben.    |
| 9. H. K.  | 54    | Rechter Sternalrand                      | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Systolisch. blasendes Geräusch an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton verstärkt.        | Schon 8 mal Gelenkrheumatismus Potatorium (6-8 L.) zugestanden. |
| 10. M B   | 37    | Etwas über den link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Blasendes systolisch. Geräusch. 2. Pulmonalton accentuirt.                        | Früher mehrmals Gelenkrheumatismus.                             |
| 11. A. W. | 16    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Systol. Geräusch an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt                      | Keinerlei Herzbeschwerden.                                      |
| 12. X. W. | 27    | Rechter Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Schwaches systol. Ger. an d. Herzspitze 2. Pulmonalton u. 2. Aortenton verstärkt. | Seit 8 Jahren jedes Jahr einen Anfall von Gelenkrheumatismus.   |

| Name      | Alter | Herzbefund.                             |                                            |                                                                                                      | Anamnese und sonstiger Befund                                                   |
|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts      | Spitzenstoss                               | Auscultation                                                                                         |                                                                                 |
| 13. C. G. | 26    | Rechter Sternalrand.                    | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Leises, sausesdes systol. Ger. an der Herzspitze.                                                    | Seit 2 Tagen geschwollene Füße.                                                 |
| 14. M. L. | 23    | Mitte des Sternums.                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Systolisches Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.                                      | Häufig Herzklopfen, sowohl bei Anstrengung als auch bei Bettruhe.               |
| 15. B. O. | 30    | Mitte des Stern.                        | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Dumpfes systol. Ger. an der Herzspitze.                                                              | Pat. will immer gesund gewesen sein. Potatorium (3 L.) zugestanden.             |
| 16. J. F. | 16    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | 1. Ton an d. Herzspitze unrein: 2. Pulmonalton accentuirt.                                           | Kopfschmerzen und Mattigkeit in den Gliedern.                                   |
| 17. L. B. | 13    | Mitte des Stern.                        | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Langgezogenes, blaueses systolisches Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalton gespalten und verstärkt. | Vor 4 Jahren Gelenk-rheumismus. Jetzt Stechen in der Brust und Atembeschwerden. |

| Name      | Alter | Herzbefund.                              |                                            |                                                                               | Anamnese und sonstiger Befund                          |
|-----------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                               | Auscultation                                                                  |                                                        |
| 18. S. S. | 22    | Mitte des Stern.                         | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Nach leichten systol. Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalt. etwas accentuirt. | Pat. ermattet leicht. Palpitatio cordis.               |
| 19. A. K. | 20    | Mitte des Stern.                         | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Dumpfes systol. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. stark accentuirt.        | Starkes Herzklopfen b. Anstrengungen.                  |
| 20. J. W. | 15    | Fast am rechten Rande des Sternums.      | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Blasesendes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. verstärkt.             | In den letzten 4 Jahren jedes Jahr Gelenkrheumatismus. |
| 21. W. Z. | 15    | Etwas über d. linken Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Leichtes systol. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. etw. verstärkt.         | Oeffter leichteres Herzklopfen u. Atembeschwerden.     |
| 22. P. K. | 18    | Ueber d. Mitte des Sternums hinaus.      | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Unreiner 1. Ton an der Herzspitze. 2. Pulmonalt. ein wenig accentuirt.        | Gliederschmerzen u. Kopfweh.                           |

| Name      | Alter | Herzbefund.                          |                                                     |                                                                              | Anamnese und sonstiger Befund.                                             |
|-----------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts   | Spitzenstoss                                        | Auscultation                                                                 |                                                                            |
| 23. J. R. | 18    | Rechter Sternalrand.                 | Im 4. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.          | Schwaches, blasendes syst. Geräusch an d. Herzspitze.                        | Vor 2 Jahren acuter Gelenkrheumatismus.                                    |
| 24. C. R. | 22    | Rechter Sternalrand.                 | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.          | Lautes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalt, etwas klappend.            | Schon seit langer Zeit Herzklopfen u. Atembeschwerden. Potatorium (2 L.)   |
| 25. O. A. | 45    | Fast recht. Sternalr.                | Nicht fühlbar, aber keine Verbreiterung nach links. | Leises syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalt. laut klappend.                 | Vor 7 Jahren und vor 1 Gelenkrheumatismus.                                 |
| 26. K. K. | 19    | Mitte des Sternums,                  | Im 4. Intercostalr. einwärts von d. Mamillarlinie.  | Ziemlich lautes, blasendes syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalt accentuirt, | Vor 6 Jahren acuter Gelenkrheumatismus. Jetzt neuer Anfall.                |
| 27. M. R. | 19    | Mitte des Sternums.                  | Nicht fühlbar, aber keine Verbreiterung nach links. | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2 Pulmonalt. accentuirt.                        | Seit langer Zeit Anfälle von Herzklopfen. Potatorium (2-3 L.) zugestanden. |
| 28. R. A. | 28    | Ueber die Mitte des Sternums hinaus. | Im 5. Intercostalraum einw. v. d. Mamillarl.        | Lautes blasend. syst. Ger. a. d. Herzspitze.                                 | Häufig stechende Schmerzen in d. Herzgegend. Schwere d. Beine.             |

## II. Frauen.

| Name      | Alter | Herzbefund.                          |                                                       |                                                                        | Anamnese und sonstiger Befund                                        |
|-----------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |       | (Grenze d. Herzdämpfung nach rechts) | Spitzenstoss.                                         | Auscultation                                                           |                                                                      |
| 29. A. R. | 21    | Mitte des Stern.                     | Im 5. Intercostalraum einwärts von der Mamillarlinie. | Lautes syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalton beträchtlich verstärkt. | Früher Scharlach u. Gelenkrheumatismus.                              |
| 30. M. R. | 27    | Rechter Sternrand.                   | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton accentuirt.                 | Seit 2 Monaten Schmerzen in d. Gliedern. Menses immer unregelmässig. |
| 31. R. W. | 24    | Rechter Sternalrand.                 | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Leises systol. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalton accentuirt.           | Früher Chlorose. Gravidität.                                         |
| 32. T. K. | 24    | Mitte des Sternums.                  | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Syst. Ger. and. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.                 | Hochgradige Anaemie und Chlorose.                                    |
| 33. W. U. | 21    | Mitte des Sternums.                  | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Systol. Geräusch an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.          | Anaemie; Magenbeschwerden.                                           |
| 34. A. R. | 23    | Mitte des Sternums.                  | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Syst. blasendes Geräusch an d. Herzsp. 2. Pulmonalton acent.           | Vor 3 Jahren Gelenkrheumatismus.                                     |

## Herzbefund.

| Name      | Alter | Grenze d. Herzdämpfung<br>nach rechts       | Spitzenstoss                                    | Auscultation                                                                   | Anamnese und sonstiger<br>Befund                                                 |
|-----------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 35. R. T. | 20    | Etwas über d. link.<br>Sternalrand hinaus.  | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | Leichtes systolisches<br>(Geräusch an d. Herz-<br>spitze.                      | Es besteht eine Pleuritis.                                                       |
| 36. C. S. | 17    | Etwas über den link.<br>Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | Deutliches syst. Ger.<br>an d. Herzspitze.                                     | Endometritis chronica.                                                           |
| 37. T. R. | 27    | Etwas über den link.<br>Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | Syst. Ger. a. d. Herz-<br>spitze. 2. Pulmonal-<br>ton klappend.                | Pat. will immer gesund ge-<br>wesen sein. Mensis unre-<br>gelmässig.             |
| 38. M. W. | 19    | Linker Sternalrand,                         | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | 1. Ton an der Herz-<br>spitze unrein. 2. Pul-<br>monalt. leicht klap-<br>pend. | Acuter Gelenkrheumatis-<br>mus.                                                  |
| 39. A. K. | 17    | Etwas über d. link.<br>Sternalrand hinaus.  | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | Deutliches syst. Ger.<br>an d. Herzspitze. 2.<br>Pulmonalt. klappend.          | Früher Gelenkrheumatis-<br>mus.                                                  |
| 40. W. S. | 22    | Etwas über d. linken<br>Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl. | Systol. Ger. an der<br>Herzspitze 2. Pul-<br>monalt. accentuirt.               | Früher Gel. Rheumatismus<br>seit 4 Wochen opfchmer-<br>zen u. geschwollene Füße. |
| 41. C. F. | 23    | Mitte des Sternums.                         | Im 5 Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl.  | Leises syst. Ger. an<br>d. Herzsp. 2. Pulmo-<br>nalt. leicht accent.           | Vor 2 Jahren und jetzt<br>Gel. Rheumatismus.                                     |

| Name      | Alter | Herzbefund.                             |                                                      |                                                                               | Anamnese und sonstiger Befund                                        |
|-----------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenzed. Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                                         | Auscultation                                                                  |                                                                      |
| 42. B. K. | 15    | Mitte d. Stern.                         | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.           | Syst. Ger. and. Herzspitze. 2. Pulmonalton klappend.                          | Keinerlei Beschwerde von Seiten d. Herzens.                          |
| 43. A. D. | 16    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.           | Lautes schabendes syst. Ger. a. d. Herzspitze.                                | Vor 1 Jahr Gelenkrheumatismus. Anaemie.                              |
| 44. T. V. | 42    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einwärts v. der Mamillarinie.    | Schabendes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. accent.                 | Die hysterische Pal. klagt über heftige Magen- und Brustschmerzen.   |
| 45. J. W. | 26    | Fast am recht. Sternalrand.             | Im 5. Intercostalr. einwärts v. der Mamillarinie.    | Systolisch. Geräusch a. d. Herzspitze.                                        | Starke Chlorose. Magenbeschwerden. Menses alle 14 Tage.              |
| 46. T. S. | 25    | Linker Sternalrand.                     | Im 4. Intercostalr. einwärts von d. Mamillarinie.    | Leichtes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton leicht accentuirt.       | Mattigkeit und Herzklopfen Chlorose.                                 |
| 47. M. E. | 21    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalraum einwärts von der Mamillarinie. | 1. Ton an d. Herzspitze unrein. 2. Pulmonalt. leicht klapp.                   | Früher Gel.-Rheumatism. Seit 5 Tag. wieder rheumatische Beschwerden. |
| 48. A. G. | 22    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum einwärts von der Mamillarinie. | Leichtes, sausesendes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt. | Seit 4 Wochen Gliederschmerzen.                                      |

| Herzbefund. |       |                                      |                                                       |                                                                          | Anamnese und sonstiger Befund                          |
|-------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Name        | Alter | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts   | Spitzenstoss                                          | Auscultation                                                             |                                                        |
| 49. M. A.   | 17    | Linker Sternalrand.                  | Im 5. Intercostalraum einwärts von d. Mamillarlinie.  | Leichtes systol. Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalt. etwas accentuirt. | Bis jetzt ohne Beschwerden.                            |
| 50. L. D.   | 66    | Mitte des Sternalr.                  | Nicht zu fühlen, aber keine Verbreiterung nach links. | Leises syst. Ger. an d. Herzspitze. 2 Pulmonalton kaum accentuirt.       | Pat. leidet an Atemnot, Schwäche u. Husten.            |
| 51. T. W.   | 58    | Mitte des Sternums.                  | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Laut., blasend. syst. Ger. an d Herzsp.                                  | Seit 1/2 Jahr Stechen in der Brust.                    |
| 52. A. L.   | 36    | Ueber d. link. Sternalrand hinaus.   | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Systol. Ger. an der Herzspitze.                                          | Pat. klagt nur über Magenbeschwerden.                  |
| 53. L. R.   | 21    | Mitte des Sternums                   | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillar.             | Lautes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton sehr klappend.        | Grosse Mattigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Chlorose. |
| 54. A. N.   | 23    | Ueber die Mitte des Sternums hinaus. | Im 4. Intercostalr. einwärts von der Mamillarlinie.   | Laut systol. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. laut klopf.            | Herzklopfen. Bronchitis.                               |
| 55. F. F.   | 17    | Mitte d. Sternalrand.                | Im 5. Intercostalr. einwärts von d. Mamillarlinie.    | Langgezogenes schabendes systolisches Geräusch an d. Herzspitze.         | Kopfschmerzen, Herzklopfen, Kurzatmigkeit.             |

| Name      | Alter | Herzbefund.                             |                                            |                                                                                   | Anamnese und sonstiger Befund                                  |
|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts      | Spitzenstoss                               | Ascultation                                                                       |                                                                |
| 56. M. G. | 21    | Mitte des Sternums                      | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Schwaches syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton ziemlich stark accentuirt.  | Grosse Mattigkeit, Herzklopfen, besonders beim Treppensteigen. |
| 57. R. S. | 42    | Fast Mitte d. Sternu.                   | Im 4. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Systol Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalton sehr wenig verstärkt.               | Im Alter von 17 Jahren sehr schwerer Gelenkrh.                 |
| 58. B L   | 21    | 1 cm. über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Lautes blasend. syst. Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalton deutlich accentuirt. | Herzklopfen und rheumatische Beschwerden.                      |
| 59. M. S. | 21    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton bedeut. verstärkt.                    | Pat. seit frühesten Jugend immer kränklich.                    |
| 60. M. K. | 18    | Rechter Sternalrand                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Kurzes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton klappend.                      | Kopfschmerzen, Herzklopfen, Chlorose                           |
| 61. F. M. | 25    | Rechter Sternalrand.                    | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl. | Lautes, schabendes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton etwas verstärkt.   | Seit 1 Jahr Atemnot bei Anstrengungen.                         |

## Herzbefund.

| Name      | Alter | Herzbefund.                                |                                               |                                                                                    | Anamnese und sonstiger<br>Be'und                                       |
|-----------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung<br>nach rechts      | Spitzenstoss                                  | Auscultation                                                                       |                                                                        |
| 62. B. R. | 19    | Linker Sternalrand.                        | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Systolisches Ger. an<br>der Herzspitze. 2.<br>Pulmonalton etwas<br>verstärkt.      | Häufig Kopfschmerz. Ohn-<br>machtsanfälle bei Anstren-<br>gungen.      |
| 63. A. F. | 16    | Linker Sternalrand.                        | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Systolisch. Geräusch<br>an d. Herzspitze. 2.<br>Pulmonalt. etw. ver-<br>stärkt.    | Kopfw. d. Gliederschmerzen<br>Mattigkeit.                              |
| 64. A. S. | 20    | Etwas über d. link.<br>Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Systol. Ger. an der<br>Herzspitze.                                                 | Hefige Gliederschmerzen.                                               |
| 65. T. M. | 18    | Rechter Sternalrand.                       | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Unreines, systolisch.<br>Ger. an der Herzsp.<br>2. Pulmonalt. verst.               | Starkes Herzklopfen Kopf-<br>schmerzen, Atemnot.                       |
| 66. B. W. | 32    | Rechtes Drittel des<br>Sternums.           | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Mässig stark systol.<br>Ger. an der Herzsp.<br>2. Pulm. u. Aortenton<br>verstärkt. | Von Jugend auf oft Herz-<br>klopfen und Seitenstechen.                 |
| 67. T. S. | 24    | Rechter Sternalrand.                       | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | 1. Ton an der Herz-<br>spitze unrein. 2. Pul-<br>monalton verstärkt.               | Herzklopfen. Beklemmun-<br>gen. Schwache Herzaction.                   |
| 68. M. F. | 20    | Linker Sternalrand.                        | Im 5. Intercostalr.<br>einw. v. d. Mamillarl. | Ziemlich lautes syst.<br>Ger. a. d. Herzspitze<br>2. Pulmonalt. verst.             | Früher Gelenkrheumatism.<br>Grosse Müdigkeit u. Abge-<br>schlagenheit. |

| Name      | Alter | Herzbefund.                             |                                                       |                                                                                     | Anamnese und sonstiger Befund                           |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |       | Grenzd. Herzdämpfung nach rechts        | Spitzenstoss                                          | Auscultation                                                                        |                                                         |
| 69. M. W. | 19    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Systol. Geräusch an der Herzspitze.                                                 | Seit 2 Tagen starke Schmerzen in d. rechten Brustseite. |
| 70. E. T. | 35    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Blasendes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. deutl. klapp.                      | Herzklopfen u. Atembeschwerden, Hysterie.               |
| 71. M. H. | 22    | Rechter Sternalrand.                    | Im 5. Intercostalr. einw. v. d. Mamillarl.            | Surrendes syst. Ger. a. d. Herzspitze.                                              | Oefters rheumatische Beschwerden.                       |
| 72. M. E. | 20    | Rechtes Drittel des Sternalrands,       | Im 5. Intercostalr. einw v. d. Mamillarl.             | Leises syst. Ger. an d. Herzspitze.                                                 | Vor 2 Jahren acuter Gelenkrheumatismus.                 |
| 73. L. H  | 21    | Recht. Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalraum einwärts von der Mamillarlinie. | Dumpf reibend syst. Ger. a. d. Herzsp.                                              | Rheumatische Beschwerden. Starke Arythmie des Herzens.  |
| 74. S. R. | 19    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. einwärts von der Mamillarlinie.   | Systol. Ger. an der Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.                          | Seit 6 Wochen Kurzatmigkeit u. Mattigkeit.              |
| 75. A. K. | 13    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intarcostalraum einwärts von der Mamillarlinie. | Sausendes systolisch. Geräusch a. d. Herzspitze 2. Pulmonalt. zieml. stark. accent. | Magenschmerzen, Uebelkeit Mattigkeit. Chlorose.         |
| 76. A. W. | 26    | Etw. über die link. Sternalrand hinaus. | Im 4. Intercostalr. einwärts von d. Mamillarlinie.    | Unreiner, geräusch. artiger 1. Ton a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.     | Stechen auf der Brust: Atembeschwerden.                 |

| Name       | Alter | Herzbefund.                                    |                                                               |                                                                                           | Anamnese und sonstiger Befund                                         |
|------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |       | Grenzd. Herzdämpfung nach rechts               | Spitzenstoss                                                  | Auscultation                                                                              |                                                                       |
| 77. R. R.  | 24    | Fast recht. Sterna-<br>rand.                   | Im 4. Intercostal-<br>einw. v. d. Mamillarl.                  | Dumpfes systol. Ger.<br>an der Herzspitze.                                                | Vor 2 Monaten acuter Ge-<br>lenkrheum.                                |
| 78. A. K.  | 18    | Linker Sterna-<br>rand.                        | Im 5. Intercostal-<br>einw. v. d. Mamillarl.                  | Kurzes syst. Ger. a.<br>d. Herzsp. 2. Pulmo-<br>naton accentuirt.                         | Keinerlei Beschwerden vom<br>Herzen.                                  |
| 79. A. D.  | 17    | Etwas über d. link.<br>Sterna-<br>rand hinaus  | Im 5. Intercostal-<br>raum einwärts von<br>der Mamillarlilie. | Deutliches syst. Ger.<br>a. d. Herzsp. 2. Pul-<br>monaton accentuirt.                     | Schmerzen in der Herzge-<br>gend.                                     |
| 80. M. B.  | 37    | Etwas über d. link.<br>Sterna-<br>rand hinaus. | Nicht fühlbar, aber<br>keine Verbreiterung<br>nach links.     | Syst. Ger. a. d. Herz-<br>spitze.                                                         | Atemnot, Druckgefühl in<br>d. Herzgegend Glieder-<br>schmerzen.       |
| 81. T. S.  | 20    | Etwas über d. link.<br>Sterna-<br>rand hinaus. | Im 5. Intercostal-<br>einwärts v. der Ma-<br>millarlilie.     | Leises syst. Ger. an<br>d. Herzspitze 2. Pul-<br>monat deutl. accent.                     | Früher heftiger Gelenk-<br>rheumatism.                                |
| 82. R. B.  | 19    | Ueber die Mitte des<br>Sternums hinaus.        | Im 5. Intercostal-<br>einw. v. d. Mamillarl.                  | Lautes, weiches syst.<br>Ger. a. d. Herzsp.<br>mit musikalischem<br>Ton. 2. Pulmon. acct. | Vor 2 Jahren Gelenkrheum.<br>Jetzt Kopfweh, Schwindel,<br>Beklemmung. |
| 83. T. II. | 22    | Rechter Sterna-<br>rand.                       | Im 5. Intercostalraum<br>einw. v. d. Mamillarl.               | Syst. Ger. a. d. Herz-<br>spitze 2. Pulm. acct.                                           | Atemnot, Herzklopfen, Mat-<br>tigkeit, Chlorose.                      |
| 84. A. S.  | 23    | Mitte des Stern.                               | Nicht fühlbar, aber<br>keine Verbreiterung<br>nach links.     | Lautes syst. Ger. a<br>der Herzspitze. 2<br>Pulm.-u. 2. Aortenton<br>sehr klappend.       | Gliederschmerzen, Herz-<br>klopfen.                                   |

| Name      | Alter | Herzbefund.                              |                                                     |                                                                                | Anamnese und sonstiger Befund.                |
|-----------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                                        | Auscultation                                                                   |                                               |
| 85. C. M. | 18    | Mitte des Sternums.                      | Nicht fühlbar, aber keine Verbreiterung nach links. | 1. Ton a. d. Herzsp. unrein. 2. Pulmonalton verstärkt.                         | Starkes Herzklopfen und Mattigkeit, Chlorose. |
| 86. M. B. | 33    | Etwas über d. linken Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum einw. v. d. Mamillarl.        | Leises syst., Ger' an d. Herzsp. 2. Pulmonalton accentuirt.                    | Oefters Gelenkrheumatismus.                   |
| 87. J. S. | 19    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalr. einwärts von d. Mamillarlinie.  | Ziemlich lautes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. leicht accentuirt.  | 4 mal Gelenkrheumatismus.                     |
| 88. A. M. | 39    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalraum einw. v. d. Mamillarl.        | Klingend. syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton ebenfalls klangartig accent. | Pat. will nie krank gewesen sein.             |

# B. Fälle die eine Verbreiterung oder Verlagerung des Spitzenstosses aufwiesen. I. Männer

| Name     | Alter | Herzbefund.                         |                                                         |                                                                          | Anamnese und sonstiger Befund                                                          |
|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts  | Spitzenstoss                                            | Auscultation                                                             |                                                                                        |
| 1. J. S. | 39    | Rechter Sternalrand.                | Ein wenig über die Mamillarlinie hinaus verlagert.      | Lautes systolisches Geräusch a. d. Herzspitze. Klappen der 2. Töne.      | Pat. schon vor 2 Jahren wegen Herzleidens in Behandlung Potatorium (7 L.) zugestanden. |
| 2. G. R. | 24    | Fast am recht. Sternalrand.         | Nicht fühlbar, aber Verbreiterung nach links.           | Systol. Ger. an der Herzsp. Töne schw. 2. Töne klappend.                 | Früher schon wegen „Herzerweiterung“ behandelt. Potatorium: 20-36 L. tägl.             |
| 3. A. H. | 21    | Mitte des Sternums.                 | Im 4. Intercostalr. etwas aussserhalb d. Mamillarlinie. | Leises schabendes systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton accentuirt. | Gelenkschmerzen.                                                                       |
| 4. M. R. | 28    | Über die Mitte des Sternums hinaus. | Im 6. Intercostalr. in d. Mamillarlinie.                | Lautes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton mässig accent.            | Mehrmals Gelenkrheumatismus. Mässiges Potatorium zugestanden.                          |
| 5. G. P. | 50    | Recht. Sternalrand.                 | Im 5. Intercostalr. etwas aussserhalb d. Mamillarlinie. | Dumpfhauchend systol. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.  | Leichte Oedeme der unteren Extremitäten.                                               |
| 6. J. M. | 39    | Mitte des Sternums.                 | Im 5. Intercostalr. in der Mamillarlinie.               | Lautes holpriges systol Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accent.    | Früher Gelenkrheumatismus. Potatorium.                                                 |

| Name      | Alter | Herzbefund.                             |                                                              |                                                                             | Anamnese und sonstiger Befund                              |
|-----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts      | Spitzenstoss                                                 | Auscultation                                                                |                                                            |
| 7. J. W.  | 25    | Nicht ganz bis zur Mitte d. Stern.      | Im 5. Intercostrallraum innerhalb u. ausserh. d. Mamillarl.  | Lautes, sausend. syst. (Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. stark acc.)        | Gelenkrheumatismus. Star-kes Potatorium zugestau-          |
| 8. J. E.  | 29    | Mitte d. Sternums.                      | Im 5. Intercostral. ausserhalb der Ma-millarlinie.           | Lautes, schlabendes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonal-ton accentuirt | Wegen Magenleidens in Be-handlung. Pot. zugegeben.         |
| 9. F. L.  | 15    | Ueber d. recht. Ster-nalrand hinaus.    | Im 4. Intercostral. in der Mamillarlin.                      | Langezog. sausend. syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalt. acc.              | Vor 4 Jahren u. vor 1 Jahr Gelenkrheumatismus.             |
| 10. J. D. | 16    | Fast recht. Sternalr.                   | Im 5. Intercostral. 1. Querfinger ausserhalb d. Mamillarlin. | 1. Ton an der Herzspitze unrein. 2. Pulmonalton zieml. stark accentuirt.    | Das Herzleiden macht dem Patienten keinerlei Be-schwerden. |
| 11. L. W. | 15    | Mitte des Sternums.                     | Im 5. Intercostral. in der Mamillarlinie.                    | Lautes. syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt              | Bei Anstrengungen leicht Herzklopfen.                      |
| 12. R. P. | 50    | 2 Querf. über den recht. Stern. hinaus. | Im 6. Intercostral. 2 Querf. ausserh. d. Mamillarlinie.      | Lautes, langezogenes syst. Ger. an d. Herzspitze. 2. Pulmonalton verstärkt. | Von Jugend auf herzlei-dend.                               |
| 13. C. P. | 49    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostral. in der Mamillarlinie.                    | Syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. verst.                               | Oedem des l. Unterschenkels durch Venenthrombose.          |

| Name       | Alter | Herzbefund.                            |                                                             |                                                                                      | Anamnese und sonstiger Befund                                           |
|------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts     | Spitzenstoss                                                | Auscultation                                                                         |                                                                         |
| 14. F. S.  | 48    | Rechter Sternalrand.                   | Im 5. Intercostalr. in der Mamillarlinie schwach,           | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton verstärkt.                               | Oefters Rheumatismus und Oedeme der unteren Extremit.                   |
| 15. J. D., | 36    | Rechter Sternalrand.                   | Im 6. Intercostalr. 1. Querfinger aussh. der Mamillarlinie. | Lautes, blasend. syst. Ger. a. d. Herzsp.                                            | Schmerzen in der Brust, Mattigkeit. Potatorium Cossale Arteriosklerose. |
| 16. J. W.  | 52    | Mitte des Sternums.                    | Im 5. Intercostalr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. verst.                                        | Gelenkschmerzen.                                                        |
| 17. J. S.  | 38    | Über den rechten Sternalrand hinaus.   | Im 5. Intercostalr. in der Mamillarlin.                     | Lautes, blasend. syst. Ger an der Herzsp. 2. Pulmonalt. accent.                      | Brustschmerzen seit 1 1/2 Jahr angeblich durch Stoss auf die Brust.     |
| 18. A. K.  | 36    | Nicht ganz bis zur Mitte des Sternums. | Im 5. Intercostalr. 1 Querfinger ausserhalb d. Mamillarlin. | Ziemlich lautes syst. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton etw. accentuirt.            | Potatorium zugestanden.                                                 |
| 19. S. F.  | 50    | Recht. Sternalrand.                    | Nicht fühlbar, aber keine Verbreiterung nach links.         | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 1. Pulmonalt. geräuschartig, 2. Pulmonalton accentuirt. | Schon lange Herzleiden Gelenkrheumatismus. Potatorium.                  |
| 20. X. S.  | 32    | Ueber die Mitte des Sternums hinaus.   | Im 4. Intercostalr. in der Mamillarlinie.                   | Ziemlich lautes syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. verst.                    | Rheumatische Schmerzen, Atemnot und Herzklopfen.                        |

| Name      | Alter | Herzbefund.                                      |                                                           |                                                                  | Anamnese und sonstiger Befund                            |
|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts               | Spitzenstoss                                              | Auscultation                                                     |                                                          |
| 21. J. G. | 22    | Fast rechtr. Sternal.                            | Im 5. Intercostr. Raum Daumenbr. ausserhalb d. Mamillarl. | Starkes syst. Ger. a. d. Herzspitze.                             | Stechen in der Brust.                                    |
| 22. C. H. | 19    | Mitte des Sternums.                              | Im 5. Intercostr. in der Mamillarlinie.                   | Kurzes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton accentuirt.       | Beim Laufen heftiges Herzklopfen.                        |
| 23. G. A. | 33    | 1 Querfinger über d. rechten Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalton accentuirt.          | Druckgefühl in der Brust. Potatorium: 5-6 L. tägl.       |
| 24. J. B. | 32    | Mitte des Sternums.                              | Im 5. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Blasendes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton verstärkt.     | Potatorium (2-4 L. tägl.) zugestanden.                   |
| 25. J. B. | 16    | Rechter Sternalrand.                             | Im 4. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Undeutliches systol. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. verst. | Es besteht eine subacute Nephritis.                      |
| 26. C. R. | 22    | Rechter Sternalrand.                             | Im 4. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Lautes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton etwas klapp.      | Schon lange Herzklopfen u. Atemnot. Mässiges Potatorium. |
| 27. C. E. | 26    | Mitte des Stern.                                 | Im 5. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. etwas verstärkt.      | (Gelenkrheumatismus.                                     |
| 28. J. H. | 38    | Rechter Sternalrand.                             | Im 5. Intercostr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.      | Undeutliches systol. Ger. a. d. Herzsp.                          | 5-6 mal Gelenkrheumatismus. Potatorium (4-5 L. tägl.)    |

# Herzbefund.

| Name        | Alter | Grenze d. Herzdämpfung<br>nach rechts      | Spitzenstoss                                                        | Auscultation                                                          | Anamnese und sonstiger<br>Befund                                    |
|-------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 29. J. F.   | 24    | Mitte des Stern.                           | Im 5. Intercostalr.<br>etwas ausserhalb d.<br>Mamillarlinie.        | Lautes rasches syst.<br>Ger. a. d. Herzspitze.                        | Keine Beschwerden von<br>Seiten des Herzens.                        |
| 30. A. R.   | 13    | Rechter Sternalrand.                       | Diffus fühlbar von d.<br>Parasternallinie bis<br>zur Mamillarlinie. | Systol. Ger. an der<br>Herzspitze.                                    | Gleichzeitig eine subacute<br>Nephritis.                            |
| ~~~~~       |       |                                            |                                                                     |                                                                       |                                                                     |
| II. Frauen. |       |                                            |                                                                     |                                                                       |                                                                     |
| 31. T. T.   | 34    | Mitte des Sternums.                        | Im 5. Intercostalr.<br>1 Querf. ausserhalb<br>d. Mamillarlinie.     | Syst. Ger. an d. Herz-<br>spitze. 2. Pulmonal-<br>ton accentuirt.     | Häufig Herzklopfen.                                                 |
| 32. M. G.   | 19    | Etwas über d. link.<br>Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalr.<br>in der Mamillarl.                            | Systolisches Ger. an<br>der Herzspitze. 2<br>Pulmonalton accent.      | Rechtsseit. Kyphoskoliose.                                          |
| 33. T. L.   | 24    | Rechter Sternalrand.                       | Im 4. Intercostalr.<br>2 Querf. ausserhalb<br>der Mamillarlinie.    | Systolisch. Geräusch<br>an d. Herzspitze 2<br>Pulmonalt. accent.      | Mehrmals Gelenkrheumatis-<br>mus. Kyphose d. Brustwir-<br>belsäule. |
| 34. M. M.   | 23    | Fast recht. Sternal.                       | Im 5. Intercostalr.<br>2 Querfinger ausser-<br>halb der Mamillarl.  | Lautes blasend. syst.<br>Ger. an der Herzsp.<br>2. Pulmonalt. accent. | Früher Gelenkrheumatis-<br>mus, Pleuritis, Pericarditis,            |
| 35. K. S.   | 51    | Ueber die Mitte des<br>Sternums hinaus.    | Im 5. Intercostalr.<br>1 Querf. ausserhalb<br>der Mamillarlinie.    | Lautes syst. Ger. a.<br>d. Herzsp. 2. Pulmo-<br>nalt accentuirt.      | Gelenkrheumatismus, Em-<br>bolia cerebri.                           |

| Name      | Alter | Herzbefund.                                |                                                                 |                                                                                            | Anamnese und sonstiger Befund                                    |
|-----------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts         | Spitzenstoss                                                    | Auscultation                                                                               |                                                                  |
| 36. K. N. | 16    | Recht. Sternalrand.                        | Im 5. Intercostaln.<br>1. Querf. ausshalb d.<br>Mamillarl.      | Lautes syst. Ger. a.<br>d. Herzsp. 2. Pulmo-<br>nalt. laut klappend.                       | Starkes Herzklopfen. Seit<br>2 Jahren stechen in der<br>Brust.   |
| 37. A. R. | 23    | Mitte des Sternums.                        | Im 5. Intercostaln.<br>in der Mamillarinie.                     | Lautes syst. Ger. a.<br>der Herzspitze.                                                    | Vor 1 1/2 Jahr Gelenkrheu-<br>matismus.                          |
| 38. S. M. | 19    | Rechter Sternalrand.                       | Im 6. Intercostaln.<br>in d. Mamillarinie.                      | Syst. Ger. a. d. Herz-<br>spitze, 2. Pulmonalt.<br>mässig accentuirt.                      | Häufig Seitenstechen und<br>rheumatische Beschwerden.            |
| 39. P. R. | 27    | 1 Querf. über den<br>recht. Stern. hinaus. | Im 5. Intercostaln.<br>in d. Mamillarinie.                      | Schabendes, kratzen-<br>des syst. Ger. an d.<br>Herzsp. und Pulmo-<br>nalis.               | Starkes Herzklopfen. Chlo-<br>rose.                              |
| 40. C. P. | 30    | Über die Mitte des<br>Sternums hinaus.     | Im 5. Intercostaln.<br>in d. Mamillarinie.                      | Schwaches syst. Ger.<br>an der Herzsp. und<br>Pulmonalis                                   | Allgemeine Schwäche, Kopf-<br>weh, Herzklopfen. Chlorose.        |
| 41. R. W. | 23    | Ueber die Mitte des<br>Sternums hinaus.    | Im 5. Intercostaln.<br>2. Querf. ausserhalb<br>d. Mamillarinie. | Ziemlich lautes syst.<br>Ger. a. d. Herzsp. 2.<br>Pulmonalt. zieml.<br>stark accentuirt.   | Vor 3 Jahren Gelenkrheu-<br>matismus. Seitdem Herzerlei-<br>den. |
| 42. A. K. | 22    | Mitte des Sternums.                        | Im 4. Intercostaln.<br>2 Querfug. aussch.<br>d. Mamillarinie.   | Sehr lautes, sausen-<br>des syst. Ger. an d.<br>Herzsp. 2. Pulmonal-<br>ton laut klappend. | Starke Chlorose, Pleuritis,<br>an d. sicca.                      |

| Herzbefund. |       |                                            |                                                                 | Anamnese und sonstiger Befund                                  |                                                                          |
|-------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Name        | Alter | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts         | Spitzenstoss                                                    |                                                                | Auscultation                                                             |
| 43. C. F.   | 14    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus.    | Im 5. Intercostalr. i. d. Mamillarl. Stark verbreitert u. hebd. | Schwaches syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. kaum accent.  | Seit einiger Zeit Herzklopfen.                                           |
| 44. C. S.   | 20    | Ueber die Mitte des Sternums hinaus.       | Im 5. Intercostalr. in d. Mamillarl. linie.                     | Lautes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. nicht klapp.     | Vor 2 Jahren acuter Gelenkrheumatismus. Seit 8 Tag. wied. rheum. Beschw. |
| 45. W. V.   | 21    | 1 Querfing. über den recht. Sternalr. hin. | Im 5. Intercostalr. 2 Querfinger ausserhalb d. Mamillarl. linie | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. rauh, klappend.     | Vor 1 Jahr Gelenkrheumatismus. Auch jetzt Gliederschmerzen.              |
| 46. B. M.   | 15    | Fast recht. Sternalr.                      | Im 6. Intercostalr. 2 Querf. ausserh. d. Mamillarl. linie.      | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. sehr laut klappd.   | Manchmal Herzklopfen.                                                    |
| 47. E. R.   | 18    | Mitte d. Sternums.                         | Im 5. Intercostalr. in der Mamillarl. linie.                    | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. klappend.           | Bei der geringsten Anstrengung Herzklopfen. Chlorose.                    |
| 48. B. H.   | 31    | Fast am recht. Sternalrand.                | Im 4. Intercostalr. in der Mamillarl. linie.                    | Deutliches syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. accentuirt.  | Seit 8 Wochen Herzklopfen. Anaemie, Chlorose.                            |
| 49. M. M.   | 52    | Rechter Sternalrand.                       | Im 7. Intercostalr. bis nahe an der vord. Axillarl. linie.      | Schwaches syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. stark klappd. | 2 mal Gelenkrheumatismus. Heftige Atembeschwerden.                       |
| 50. B. S.   | 23    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus.    | Im 5. Intercostalraum 1 Querf. ausserhalb der Mamillarl. linie. | Schwaches syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. accentuirt.   | Von Jugend auf Herzklopfen. Chlorose.                                    |

| Name      | Alter | Herzbefund.                              |                                                             |                                                                                       | Anamnese und sonstiger Befund.                                              |
|-----------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                                                | Auscultation                                                                          |                                                                             |
| 51. C. S. | 23    | Fast rechtl. Sternal.                    | Im 5. Intercostalraum in der Mamillarlinie                  | Lautes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton stark accent.                          | Die hysterische Pat. klagt hauptsächlich über Magen- und Kopfschmerzen.     |
| 52. A. S. | 23    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalraum in der Mamillarlinie.                 | Lautes blasend. syst. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton stark klappend.              | Vor 5 Jahren Gelenk-rheumatismus; seitdem geringe Herzbeschwerden Chlorose. |
| 53. A. M. | 18    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus.  | Im 5. Intercostalraum in der Mamillarlinie                  | Kurzes, schabendes syst. Ger. a. d. Herzspitze. von wechselnder Stärke                | Hauptbeschwerden durch Chlorose.                                            |
| 54. J. P. | 70    | Rechter Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalraum 1 Querf. ausserhalb d. Mamillarlinie. | Lautes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton verstärkt.                             | Starke Arrhythmie der Herzthätigkeit. Eiweiss im Urin.                      |
| 55. M. A. | 15    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus   | Im 5. Intercostalraum in der Mamillarlinie.                 | Schwaches syst. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton accent.                            | Besonders bei Anstrengungen starkes Herzklopfen. Chlorose.                  |
| 56. M. M. | 26    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalraum ausserhalb Mamillarl.                 | Lautes, schabendes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton u. 2. Aortenton accentuirt | Einigmal Gelenk-rheumatismus, Pleuritis u Pericarditis.                     |
| 57. M. B. | 21    | Etwas über d. linken Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostalraum in der Mamillarlinie.                 | Syst. Ger. a. d. Herzspitze 2. Pulmonalton. 2. Aortenton acc.                         | Stechen in der Brust.                                                       |

| Name      | Alter | <b>Herzbefund.</b>                      |                                                          |                                                                               | Anamnese und sonstiger Befund                                       |
|-----------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenzd., Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                                             | Auscultation                                                                  |                                                                     |
| 58. A. R. | 59    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostrahl. etwas ausserhalb der Mamillarlinie. | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. etwas verstärkt.                   | Oft Gelenkrheumatismus.                                             |
| 59. A. B. | 27    | Mitte d. Stern.                         | Im 5. Intercostrahl. etwas ausserhalb der Mamillarl.     | Syst. Ger. a. d. Herzspitze. 2. Pulmonalt. u. 2. Aortent. klapp.              | Starkes Herzklopfen und Atembeschwerd. Chlorose.                    |
| 60. A. H. | 25    | Mitte des Stern.                        | Von der Sternal. bis zur Mamillarl. fühlb.               | Blasendes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. verstärkt.                   | Als Kind hat Pat. schwere Gelenkrheumat. durchgem. Seitdem leidend. |
| 61. K. W. | 20    | Linker Sternalrand.                     | Im 5. Intercostrahl. ausserh. d. Mamillarl.              | Blasendes syst. Ger. a. Mitrals u. Trienspidalis; 2. Pulmonalt. deutl. klappd | Seit 3 Jahren Kopfweh, allgemeine Mattigkeit. Chlorose.             |
| 62. B. M. | 20    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostrahl. ausserh. d. Mamillarl.              | Systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalt. ton gespalten.                      | Seit längerer Zeit Herzklopfen.                                     |
| 63. T. K. | 38    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostrahl. in der Mamillarl.                   | Systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalt. ton accentuirt                      | Vor 13 Jahren Gelenkrheumatismus. Seitdem Herzscherwerden.          |
| 64. M. K. | 18    | Mitte des Sternums.                     | Im 5. Intercostrahl. 2 Querrf. aus. d. Mam.              | Lautes blasend. syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalt. klappd                 | Kopfschmerzen, Atemnot, Chlorose.                                   |
| 65. A. L. | 22    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus. | Im 5. Intercostrahl. 1 Querrf. aus. d. Mam.              | Kurzes systol. Ger. an der Herzsp.                                            | Heftige Brustschmerz., Appetitlosigkeit, Chlorose.                  |

| Name      | Alter | Herzbefund.                              |                                                              |                                                                             | Anamnese und sonstiger Befund                                              |
|-----------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts       | Spitzenstoss                                                 | Auscultation                                                                |                                                                            |
| 66. C. D. | 35    | Rechter Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. 1. Querfinger ausserhalb d. Mamillarlin. | Syst. Geräusch a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton wenig klappend.                 | Bei Anstrengung leicht Herzklopfen.                                        |
| 67. E. S. | 31    | Etwas über d. link. Sternalrand hinaus.  | Im 5. Intercostalr. 1. Querfinger aush. der Mamillarlinie.   | Systol. Ger. an der Herzsp.                                                 | 2 mal Gelenkrheumatismus.                                                  |
| 68. C. F. | 22    | Fast rechtr. Sternal.                    | Im 4. Intercostalr. auswärts von d. Mamillarlinie.           | Klingendes syst. Ger. a. d. Herzsp. 2. Pulmonalton u. 2. Aortent. klappend. | Zeitweilig Stechen in der Brust. Chlorose.                                 |
| 69. K. D. | 20    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalraum in d. Mamillarlinie.                   | Lautes syst. Ger. an der Herzsp.                                            | Gelenkschmerzen. Seitenstechen.                                            |
| 70. W. S. | 21    | Mitte des Sternums.                      | Im 5. Intercostalraum in d. Mamillarlinie.                   | Systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalton stark klappend.                  | Seit 1 Woche Kopfschmerzen. Herzklopfen, Stechen in d. Brust.              |
| 71. E. S. | 27    | Etwas über die Mitte d. Sternums hinaus. | Im 4. Intercostalr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie.       | Blasendes syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonal. verst. u. klapp.            | Hefige Gliederschmerzen. Hefige Kopfschmerz. Häufig Herzklopfen. Chlorose. |
| 72. M. H. | 23    | Rechter Sternalrand.                     | Im 5. Intercostalr. etwas ausserhalb der Mamillarlinie.      | Deutliches syst. Ger. an d. Herzsp. 2. Pulmonalton stark acut.              | Seit 4 Jahren häufig Herzklopfen u. Atemnot. Chlorose.                     |
| 73. C. B. | 19    | Ueber den rechten Sternalrand hinaus.    | Im 4. Intercostalr. ausserhalb der Mamillarlinie.            | Sehr undeutl. systol. Ger. an der Herzsp. 2. Pulm. stark klappend.          | 9 mal Gelenkrheumatismus.                                                  |

| Name      | Alter | Herzbefund.                        |                                                        |                                                                     | Anamnese und sonstiger Befund                |
|-----------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |       | Grenze d. Herzdämpfung nach rechts | Spitzenstoss                                           | Auscultation                                                        |                                              |
| 74. A. T. | 23    | Linker Sternalrand.                | Im 5. Intercostalr. ausserhalb der Mamillarlinie.      | Lautes syst. Ger. an der Herzsp. 2. Pulmonalt. laut klapp.          | 9 mal Gelenkheumatismus, 1 mal Pericarditis. |
| 75. A. G. | 60    | Mitte des Sternums.                | Bis zur vorderen Axillarlinie fühlbar.                 | Syst. Geräusch a. d. Herzsp. 2. Aortenton stark accentuirt.         | Schrumpfniere.                               |
| 76. E. K. | 28    | Rechter Sternalrand.               | Im 5. Intercostalr. etwas ausserhalb d. Mamillarlinie. | Systol. Geräusch an der Herzsp. 2. Pulmonalt. zieml. laut klappend. | Keine Herzbeschwerd. Hy-sterie.              |

Unterziehen wir nun die vorstehende Statistik einer kurzen kritischen Durchsicht.

Zunächst finden wir, dass die Tabelle A, d. h. das Verzeichnis derjenigen Fälle, bei denen sich der Spitzenstoss an normaler Stelle fand, die Tabelle B, d. h. das Verzeichnis der Fälle, die eine Verbreiterung oder Verlagerung des Spitzenstosses aufwiesen, schon in numerischer Hinsicht übertrifft.

Die Tabelle A enthält 28 Männer und 60 Frauen, insgesamt 88 Fälle.

Die Tabelle B enthält 30 Männer und 46 Frauen insgesamt 76 Fälle.

Das Verhältnis verschiebt sich aber bedeutend zu Ungunsten der Tabelle B, wenn wir diejenigen Fälle der Tabelle B in Betracht ziehen, die einen anderweitigen Grund für die Vergrösserung des linken Ventrikels wahrscheinlich erscheinen lassen.

In dieser Beziehung kommen in Betracht:

I. Unter den Männern der Tabelle B:

13 Fälle mit mehr oder weniger starkem Pototarium,  
2 Fälle mit Albuminurie.

II. Unter den Frauen der Tabelle B:

16 Fälle mit früherer oder noch bestehender Chlorose  
2 Fälle mit Albuminurie  
2 Fälle mit Difformität des Thorax.

Ziehen wir diese 35 Fälle von den 76 Fällen der Tabelle B ab, so bleiben noch 41 Fälle übrig, in denen ohne nachweisbare sonstige Ursache der Spitzenstoss verlagert war; also genau der vierte Teil aller zur Beobachtung gelangten Fälle.

Die von Frensdorff ausgeführte analoge Statistik von der zweiten Abteilung des hiesigen Krankenhauses ergab, dass daselbst unter 84 beobachteten Fällen von reiner Mitralinsuffizienz 11 waren, die eine Verbreiterung des linken Ventrikels ohne anderweitig erkennbare Ursache aufwiesen.

Vereinigen wir nun das Ergebnis der Statistiken, so darf man wohl auf Grund des grossen zur Untersuchung gelangten Materials mit Bestimmtheit zu dem Schlusse kommen, dass in etwa dem sechsten Teile aller Fälle von Mitralinsuffizienz eine Vergrösserung des linken Ventrikels ohne anderweitig erkennbare Ursache sich einstellt. Dagegen wird durch die weitaus grössere Anzahl von Fällen, wo eine Vergrösserung des linken Ventrikels nicht vorhanden war, schlagend bewiesen, dass die Ansicht, dass zur Compensation der Mitralinsuffizienz eine Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels unbedingt erforderlich sei, unhaltbar ist.

Zum Schlusse liegt mir noch die angenehme Pflicht ob, Herrn Geheimrath v. Ziemssen für die freundliche Ueberlassung des Materials meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

---

## Litteratur.

1. Annalen der städtischen allgemeinen Krankenhäuser in München. Band I 1878.  
Bericht der 2. medicinischen Klinik und Abteilung des Oberarztes Prof. Dr. v. Ziemssen für die Jahre 1874 1875 von Prof. Dr. I. Bauer.
  2. Bamberger, Lehrbuch der Krankheiten des Herzens, 1857.
  3. v. Basch, Allgemeine Physiologie und Pathologie des Kreislaufs. Wien 1892.
  4. Duchek, die Krankheiten des Herzens. Erlangen 1862.
  5. Frensdorff, Statistische Mitteilungen über die Grössenverhältnisse des Herzens bei compensierter Mitralinsuffizienz. J. D. München 1896.
  6. Friedreich, die Krankheiten des Herzens in Virchow's spec. Path. u. Therapie Band V 1867.
  7. Rosenbach, Herzkrankheiten in Eulenburgs Realencyclopaedie.
  8. Scoda, Abhandlung über Auscultation und Percussion, 1864.
  9. Schroetter. Krankheiten des Herzfleisches, in v. Ziemssen's Handbuch der spec. Path. und Therapie.
  10. Stern, Diagnostik der Brustkrankheiten, Wien 1877.
  11. Waldenburg, Pulsuhr und Puls, Berliner klinische Wochenschrift 1878, No. 47; ferner die Messung des Pulses und Blutdruckes vom Menschen. Berlin, 1880.
  12. A. Weil, zur Lehre von der Mitralklappeninsuffizienz, Berliner klinische Wochenschrift 1881 No. 7.
-